

# 家畜衛生だより

令和6年2月21日 No.55  
庄内家畜保健衛生所  
庄内地区家畜畜産物衛生指導協会  
TEL 0235(68)2151  
FAX 0235(66)2466

## HPAI 発生予防対策 および異状家きん早期通報の再徹底を！

2月11日に発生した高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の国内9例目の事例において、国内8例目まで（H5N1亜型）と異なる **H5N6 亜型** が検出されました。今シーズンの国内死亡野鳥からは H5N1 亜型のほか、H5N6 亜型、H5N5 亜型等が検出されており、異なる亜型による HPAI 発生が続く可能性があります。

これから渡り鳥の北帰行が本格化し、HPAI 発生リスクはさらに高まります。HPAI 発生予防対策及び異状家きんの早期発見・早期通報の徹底をお願いします。

### 1 HPAI 発生予防対策を徹底！

- ・専用衣服及び長靴の着用、衛生管理区域及び車両の消毒など、衛生対策を徹底してください。
- ・家きん舎の隙間や破損がないか点検し、速やかに修繕してください。

### 2 異状家きんの早期発見及び早期通報を徹底！

- ・家きんの異状を認めた場合は速やかに家保に連絡してください。通報が遅れると、地域のまん延リスクが高まるだけでなく、殺処分された家きんに対する手当金が減額されることがあります。

庄内家畜保健衛生所0235-68-2151

次のページのリーフレットも確認してください

# 高病原性 鳥インフルエンザ

引き続き最大限の警戒を！！

## ！ 農場の発生予防対策を徹底しましょう

- ・ 飼養衛生管理基準の遵守状況を点検し、不備があれば改善
- ・ 農場従業員や外部事業者等を含め、専用の衣服や長靴の着用、消毒等の衛生対策を徹底
- ・ 家きん舎の隙間の常々点検し、遅滞なく修繕



## ！ 異状の早期発見・早期通報を徹底しましょう

- ・ 以下の異状を認めた場合は、最寄りの家畜保健衛生所に相談ください。

- ① 同一の家きん舎内において、1日の家きんの死亡率が過去3週間における平均の家きんの死亡率の2倍以上となっている
- ② 5羽以上の家きんが、まとまって死亡している又はまとまってうずくまっている

- ・ 上記以外であっても、通常時と異なる状態であると感じた場合は、他の疾病を疑う場合でも最寄りの家畜保健衛生所に相談しましょう。

※ 通報の遅延は、地域における本病のまん延リスクを高めるだけでなく、殺処分された家きんに対する手当金が減額となる場合があります。